

2022~2023 学年高三第五次联考试卷(样)


地 理

考生注意:

1. 本试卷分选择题和非选择题两部分。满分 100 分,考试时间 90 分钟。
2. 答题前,考生务必用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3. 考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4. 本卷命题范围:地球地图+区域地理+必修第一册、第二册+选择性必修 1、必修 2。


一、选择题:本大题共 22 个小题,每小题 2 分,共 44 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

中印经贸合作区位于印度尼西亚重要的工业走廊——雅加达—万隆经济带的中心地区。中印经贸合作区采用“园中国”(享受大园区提供的基础设施及配套服务,小园区需向大园区缴纳相应的管理费用)发展模式。截至 2020 年 7 月,中印经贸合作区已经入驻了机械汽配、基建建材、仓储物流、食品加工、包装印刷等行业的 55 家企业。下图示意中印经贸合作区位置。据此完成 1~2 题。



1. 中印经贸合作区吸引中国企业大量入驻的优势条件是
①便捷的交通 ②先进的科技 ③丰富的劳动力 ④发达的经济
A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④
2. 中印经贸合作区采用“园中国”的发展模式,对中方企业的主要有利影响是
A. 节省企业管理费用 B. 减少基础设施投资
C. 保持企业的独立性 D. 降低企业用工成本

下图示意 1963~2017 年川渝地区不同人口流动类型变化。据此完成 3~4 题。




3. 2008 年以前,川渝地区人口流动的特点是

- A. 以同外部流动为主
- B. 以省市内流动为主
- C. 互相流动人口变化幅度大
- D. 省市内流动人口大于外部

4. 2008 年以后,川渝地区流动人口发生变化的主要原因是该地区

- A. 人口数量大幅减少
- B. 户籍政策管理放宽
- C. 交通运输发展滞后
- D. 经济发展水平提高

作为城市商业的重要空间载体,商业中心已成为目前城市居民综合性消费游憩的重要场所,其配有购物中心、百货店及品牌专卖店等多元商业业态,可同时满足居民的购物、餐饮、消费娱乐等商业需求。为增强商业可持续发展能力,优化商业空间布局,上海制定并发布《上海市商业网点布局规划(2014~2020 年)》,重点规划 15 个市级商业中心。下图示意上海市级商业中心分布。据此完成 5~7 题。



5. 图示上海市级商业中心居民惠顾行为衰减最显著的是

- A. 5
- B. 13
- C. 14
- D. 15


6. 影响上海市级商业中心客流量的主要因素有

- ①城市环路走向 ②行政区划边界 ③商业中心等级 ④居民闲暇时间
- A. ①②
- B. ②④
- C. ①③
- D. ③④

7. 上海市级商业中心的分布

- A. 向郊区扩张,呈多中心化发展
- B. 不利于中心城市空间结构优化
- C. 商业中心服务范围不重叠
- D. 会加剧同质化竞争和重复建设

乐陵市位于鲁西北平原(由黄河冲积而成),已经有 3 000 多年种植乐陵金丝小枣的历史。乐陵金丝小枣喜温、喜光,果实皮薄肉厚,品质优异,获批农产品国家地理标志。掰开半干的乐陵金丝小枣可清晰地看到由果胶质和糖组成的缕缕“金丝”粘连于果肉之间(如下图所示),拉长 1~2 寸不断。乐陵金丝小枣每年 5 月中旬至 6 月底开花,10 月上旬前成熟,花期无花多,消耗的营养多。据此完成 8~10 题。



8. 乐陵金丝小枣获批农产品国家地理标志,关键在于


- A. 便利的水运交通
- B. 独特的自然环境
- C. 传统的生产方式
- D. 丰富的种植经验

9. 半干的乐陵金丝小枣中有缕缕“金丝”,主要得益于

- A. 昼夜温差较大
- B. 土壤质地黏重
- C. 夏季降水集中
- D. 晾晒技术精湛


10. 为了提高金丝小枣的产量和品质,6 月份乐陵市的枣农应及时
- A. 修剪枝条
 - B. 铺反光膜
 - C. 定期排水
 - D. 灌溉施肥

北京时间 2021 年 9 月 23 日 3 时 21 分迎来“秋分”节气,标志着我国绝大部分地区正式进入凉爽的秋季。今年华北多地秋天迟到,长江流域入秋也偏晚。下图示意中国天气网制定的 2021 全国入秋进程(截至 9 月 22 日)。据此完成 11~13 题。




11. 我国迎来“秋分”节气时,全球
- A. 正好处于同一天
 - B. 黑夜的比例较大
 - C. 新的一天比例小
 - D. 白天的比例较大
12. 昆明比贵阳先入秋的主要影响因素是
- A. 纬度位置
 - B. 海拔高度
 - C. 海陆位置
 - D. 洋流性质
13. 今年华北多地秋天迟到,长江流域入秋也偏晚,主要是因为
- A. 副热带高压较强
 - B. 冷空气活动频繁
 - C. 夏季风势力较弱
 - D. 台风较往年偏多

晴空回波通常是雨后天晴时由于地表水汽蒸发使空气湿度增加,悬浮于近地面的大量水珠对电磁波产生反射而形成。下图示意 2017~2019 年北京地区晴空回波顶高度与地面气温对比逐日变化。据此完成 14~15 题。



14. 11:00~13:00 时晴空回波顶分布高度与下列大气现象密切相关的是
- A. 大气对流旺盛
 - B. 近地面风力强
 - C. 大气逆辐射强
 - D. 大气逆温显著
15. 正常年份,北京地区晴空回波顶分布高度最大值可能出现在
- A. 1~3 月
 - B. 4~6 月
 - C. 7~9 月
 - D. 10~12 月

纳米比亚年降雨量从西南沿海的不足 50 mm 过渡到东北地区的 700 mm。内地冬季白天平均气温 18~25℃,夜间气温常常低于 0℃,内陆沙漠区常有大雾。下图示意纳米比亚地理位置及其周边地区。据此完成 16~17 题。




16. 纳米比亚内陆沙漠区的大雾

A. 成因是水汽充足
B. 主要与温差有关
C. 能促进降水形成
D. 有助于污染扩散
17. 图示洋流的成因是

A. 盛行东风吹拂
B. 海水密度差异
C. 海水补偿作用
D. 海陆轮廓影响

造礁珊瑚适宜在高温、高盐、强流速和硬质基岩的海洋环境中生长和发育。台湾岛南端化石珊瑚礁和现生珊瑚礁都很发达;东部沿岸海域为基岩;西部丘陵和平原为疏松沉积层,河流主要分布在岛屿西部,挟带大量泥沙输入邻近海域,形成泥滩地;东北部虽然有造礁珊瑚分布,但未形成珊瑚礁。下图示意台湾地区造礁珊瑚分布(黑色粗线)。据此完成 18~19 题。




18. 推测台湾岛沿岸最可能出现典型贝壳海滩的是

A. 东部海岸
B. 西部海岸
C. 南部海岸
D. 北部海岸
19. 与东部海岸相比,台湾岛西部海岸少有造礁珊瑚分布的主要原因是

A. 海水温度较低
B. 海底地震频发
C. 海面风浪较大
D. 缺乏基岩底质

克里特岛位于地中海东部的居中位置,是希腊的第一大岛,地形以山地为主,地势起伏较大。岛上旅游资源丰富,西欧和北欧是该岛最重要的客源市场。岛上有一个国际机场,其繁忙程度在希腊仅次于雅典国际机场。下图示意克里特岛地理位置。据此完成 20~22 题。




20. 克里特岛位于
- A. 海岭附近 B. 板块消亡边界 C. 海沟附近 D. 板块生长边界
21. 克里特岛上已有的机场最可能位于图中
- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地
22. 克里特岛上机场最繁忙的季节可能是
- A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季

二、非选择题:共 56 分。

23. 阅读图文材料,完成下列要求。(18 分)

哥斯达黎加位于中美洲,是中美洲农业发展水平最高的国家之一,是中美洲第一个因商业价值而种植咖啡和香蕉的国家。哥斯达黎加是世界上生物物种最丰富的国家之一,20 世纪七八十年代,由于乱砍滥伐,哥斯达黎加森林覆盖率从 75% 下降到 21%,生物物种也逐渐减少。20 世纪九十年代,哥斯达黎加建立生态补偿机制,进行森林保护。下图示意哥斯达黎加地理位置及其周边地区。




- (1)指出哥斯达黎加东部地区的主要植被类型,并分析其成因。(6 分)
- (2)从生态环境角度,说明哥斯达黎加进行森林保护的重要性。(6 分)
- (3)简述哥斯达黎加种植咖啡和香蕉的优势自然条件。(6 分)

24. 阅读图文材料,完成下列要求。(18 分)

高沟镇位于安徽省无为市,是全国闻名的电缆之乡和特种电缆产业的发源地,电缆产业集群化、专业化特色明显。高沟镇电缆产业集群创新网络(产业集群创新网络是以企业为创新主体,通过与其他企业、政府、研究机构在长期交互创新下形成的相对稳定的系统)经历了初生期,发展期和结成期。


1991 年高沟镇第一家特种电缆企业——安徽华海电缆厂筹办成立,1999 年镇内个体私营企业达到 357 家;2011~2018 年高沟镇达到规模以上电缆产业总产值均超过 150 亿元,在绝缘护套、电线电缆等自主创新方面均取得重大成就,多家企业获得欧盟、国际电工标准等认证。下图示意安徽省高沟镇位置。



- (1)评价高沟镇电缆企业发展的条件。(6 分)
- (2)说明高沟镇电缆产业集群创新网络初生期的特点。(6 分)
- (3)请你为高沟镇扩大电缆产业集群创新网络提出合理的建议。(6 分)

25. 阅读图文材料,完成下列要求。(20 分)

小海潟湖地处海南省万宁市境内,现代水域面积约为 46 km²。小海潟湖呈腹大口小的葫芦状,海岸类型为典型的沙坝——潟湖海岸。该潟湖发育初期可能由一系列断续岛状沙堤环抱而成,有多条通道与外海连通,但目前仅有潟湖东北角一条单一通道与南海相通。小海潟湖属咸水湖,潟湖潮汐汉道区平均盐度为 8.6‰~31‰。自 1973 年口门北侧修建防沙堤之后,南沙嘴快速发展使口门不断束窄,目前口门的宽度只有 30 m 左右。潟湖四周地势平坦,有多条河流入湖,经人工改道后原小海潟湖最大的补给径流——太阳河已于 1972 年流入南海,干流不再入湖,20 世纪 80 年代小海潟湖沉积物的含氮量也呈快速上升趋势。下图示意小海潟湖地理位置。



- (1)分析小海潟湖东侧沙坝的成因。(4 分)
- (2)指出小海潟湖水盐度的分布特征,并说明理由。(6 分)
- (3)简述太阳河改道后对小海潟湖水环境的影响。(4 分)
- (4)说明 20 世纪 80 年代小海潟湖沉积物中含氮量快速上升的原因。(6 分)