

答题栏

- | 题号 | 答案 |
|----|----|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |

抢分笔记

- [illegible]

6. 2020 年我国育龄妇女总和生育率较低的主要原因可能是


- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

A. 北京 B. 上海 C. 吉林 D. 贵州



A. 完善托幼服务体系,降低托幼教育费用

- B. 缩短义务教育范围,减少学生在校时间
- C. 完善养老保障制度,使老年人老有所依
- D. 降低妇女劳动参与率,使妇女回归家庭

答题栏



—●—月最高气温 —◆—月最低气温




9. 与伊斯兰堡相比,卡拉奇
- A. 月最高气温年变化更大
- B. 降水季节变化更大
- C. 月最低气温年变化更大
- D. 年总降水量更大
10. 伊斯兰堡和卡拉奇 7、8 月份最高气温都偏低,其主要影响因素是
- A. 地形
- B. 降水
- C. 植被
- D. 太阳高度

题号	答案
9	
10	

抢分笔记


[illegible]

答题栏



11. 夏至日新加坡地区的“夜晚”时间约为
- A. 9.6 小时 B. 10.8 小时
C. 11.2 小时 D. 12 小时
12. 某一段时间内北京某中学地理兴趣小组成员向东北方向拍摄曙光,发现曙光拍摄时间在提前。该时间段可能在
- A. 春节期间 B. 劳动节前后
C. 建军节前后 D. 国庆节前后

贡嘎山位于四川省西部,是大雪山的主峰。下图为贡嘎山东坡植被垂直分布图,图中次生阔叶林处的表层土壤有机质含量较低。据此完成 13~15 题。



13. 代表贡嘎山水平地带分布的植被类型是
A. 落叶阔叶林 B. 针阔混交林 C. 常绿阔叶林 D. 针叶林
14. 次生阔叶林处的表层土壤有机质含量较低的主要原因是
A. 枯落物输入率高, 分解率高
B. 枯落物输入率高, 分解率低
C. 枯落物输入率低, 分解率低
D. 枯落物输入率低, 分解率高
15. 研究发现, 落叶阔叶林的生物量较针阔混交林的生物量小。
导致二者生物量差异的主要因素是
A. 气温 B. 光照 C. 降水 D. 土壤

题号	答案
11	
12	
13	
14	
15	

抢分笔记

[illegible]